

Bovinos

BRINCO Fiprotag[®] 210

Uso Veterinário

Brinco inseticida indicado para o tratamento de infestações causadas pela Mosca-dos-chifres em bovinos.

Para parasitas sensíveis ao princípio ativo da fórmula.

FÓRMULA:

Cada brinco com 15g contém:

Diazinon	5,4g
Fipronil	0,6g
Excipiente q.s.p.	15,0g

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE E LEITE: CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:

FIPROTAG 210 é um brinco inseticida, pronto para uso, indicado para o tratamento de infestações causadas pela mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
TÓPICA.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

O brinco deve ser aplicado através de um aplicador, específico para brincos em animais, na região mediana da face externa da orelha, evitando a perfuração dos vasos sanguíneos na cartilagem auricular. Aplicar um brinco por animal.

Importante: Para evitar aparecimento de resistência, todos os animais do mesmo lote devem ser tratados. Os brincos devem ser retirados 210 dias após a aplicação, cortando o pino fixador com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, novos brincos deverão ser colocados.

RECOMENDAÇÕES:

- MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.

- Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: luvas, botas, avental, macacão e outros, durante a manipulação e aplicação do produto.
- Não guardar ou aplicar os brincos junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para abelhas.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.
- Remover os brincos antes do abate dos animais.
- Utilizar o produto ao ar livre ou em ambientes bem ventilados.

ACIDENTES EM HUMANOS:

Em caso de exposição acidental, lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

Em caso de acidente ocular, lavar imediatamente com bastante água corrente e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Contrathion).

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar em bezerros com menos de três meses de idade, pois o pino aplicador pode causar danos teciduais às orelhas.

GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO:

Organofosforado (diazinon) e fenilpirazol (fipronil).

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.

Rua 4, S/N, Lt. 47/55, Qd. 07, Setor Conde dos Arcos.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

www.vetoquinol.com.br

SAC: 0800 741 1005

Resp. Técnico:

Gladstone Santos de Souza, PhD

CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado pelo MAPA desde 01/02/2021.

Registrado sob o nº GO 000005-1.000026.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

